

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 01 năm 2019

THÔNG TIN THUỐC
V/v cập nhật thông tin một số thuốc

Kính gửi: Các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Căn cứ vào Quyết định 495/QĐ-BV ngày 19/09/2017 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về việc thành lập Đơn vị thông tin thuốc trong Bệnh viện;

Căn cứ vào Danh mục thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2018-2019,

Nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Đơn vị Thông tin thuốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cập nhật thông tin một số thuốc như sau:

1. Cập nhật tình trạng thuốc hướng tâm thần

TT	Mã thuốc hiện sử dụng	Tên thuốc	Đơn vị	Đường dùng	Ghi chú
1	KET004	Ketamin 500mg/10ml	Lọ	Tiêm	Tình trạng: sẵn có...

2. Cập nhật điều kiện bảo quản đối với thuốc Suxamethonium 100mg/2ml

TT	Mã thuốc hiện sử dụng	Tên thuốc	Dạng bào chế	Đơn vị	Đường dùng	Điều kiện bảo quản
1	SUX003	Suxamethonium 100mg/2ml (Nhóm thuốc giãn cơ)	Bột pha dung dịch tiêm/tiêm truyền	Lọ	Tiêm	- Lọ chưa mở nắp: Nơi khô, nhiệt độ $\leq 30^{\circ}\text{C}$, tránh ánh sáng. - Dùng ngay sau khi mở nắp. - Sau khi pha loãng: Dung dịch ổn định trong 24 giờ ở 2-8 $^{\circ}\text{C}$...

3. Hướng dẫn sử dụng đối với một số thuốc tiêm

TT	Mã thuốc hiện sử dụng	Hoạt chất, nồng độ, hàm lượng	Dạng dùng, đường dùng	Hướng dẫn sử dụng
1	ESO003 EDI003	Esomeprazol 40mg	Lọ, bột pha tiêm	Chỉ định: Thay thế đường uống khi: Trào ngược dạ dày thực quản trên người bệnh viêm thực quản và/hoặc trào ngược nặng; Loét dạ dày do dùng NSAIDs; Dự phòng loét dạ dày tá tràng do dùng NSAID ở người bệnh có nguy cơ. Cách dùng: - Tiêm: 40mg esomeprazol pha trong 5ml NaCl 0.9% Tiêm ≥ 3 phút. - Tiêm truyền: 40mg esomeprazol pha trong 100ml NaCl 0.9%. Tiêm truyền 10-30 phút. Bảo quản: Nên dùng trong vòng 12 giờ sau khi pha và tốt nhất là dùng ngay sau khi pha...
2	OME006	Omeprazol 40mg	Lọ, bột pha tiêm	Chỉ định: Trào ngược dạ dày-thực quản; Loét dạ dày-tá tràng; Hội chứng Zollinger-Ellison. Cách dùng: 40mg omeprazol pha trong 100ml NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%. Truyền tĩnh mạch trong 20-30 phút. Bảo quản: Sau khi pha, ở $t^{\circ} \leq 25^{\circ}\text{C}$, phải sử dụng trong 6 giờ nếu pha trong glucose 5%, trong 12 giờ nếu pha trong NaCl 0.9%...

TLTK: Bộ y tế (2018), *Dược thư quốc gia Việt Nam*, NXB Y học, Hà Nội; Thông tin từ nhà sản xuất; Alistair Gray, Jane Wright, Vincent Goodey and Lynn Bruce (2011), *Injectable Drugs guide*.

Nay Đơn vị thông tin thuốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thông báo đến các khoa phòng điều trị được biết và kê đơn sử dụng theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu: ĐVTTT

P. CHỦ TỊCH HĐT&ĐT

ĐV THÔNG TIN THUỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

P. GIÁM ĐỐC
BS. Nguyễn Ích Tuấn

DS. Viên Cẩm Tú