

THÔNG TIN THUỐC
V/v sử dụng thuốc chống Parkinson Syndopa 275

Kính gửi: Các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Căn cứ vào Quyết định 495/QĐ-BV ngày 19/09/2017 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về việc thành lập Đơn vị thông tin thuốc trong Bệnh viện;

Căn cứ vào Danh mục thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2019,

Nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Đơn vị Thông tin thuốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thông tin về thuốc **Syndopa 275 (Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg)** như sau:

| Tên Hoạt Chất Nồng Độ Hàm lượng | Dạng dùng | Phân loại theo nhóm tác dụng dược lý | Hướng dẫn sử dụng |
|--|------------|--------------------------------------|---|
| Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg (Syndopa) | Viên, Uống | Thuốc chống Parkinson | 1. Dược lý: - Levodopa là tiền chất trực tiếp của dopamin, có tác dụng giống như dopamin. Khi được đưa vào cơ thể, levodopa qua được hàng rào máu - não và được chuyển hóa thành dopamin tại các hạch đáy não nên bù lấp được sự thiếu hụt dopamin ở các nhân đáy não có vai trò trong điều hòa trương lực cơ. - Carbidopa là chất ức chế enzym decarboxylase (enzym khử carboxyl) ngăn cản khử carboxyl của levodopa ở ngoại vi, làm tăng lượng levodopa trong máu nên tăng lượng levodopa vào não. 2. Dược động học: Levodopa cùng với thức ăn làm trì hoãn tính hấp thu thuốc và giảm nồng độ đỉnh trong huyết tương khoảng 30%. Kết hợp với carbidopa thì thuốc đến hệ thần kinh trung ương với liều đủ và tổng liều levodopa cần thiết giảm xuống 75%. Thải trừ chủ yếu qua nước tiểu trong vòng 24 giờ. Carbidopa chuyển hóa nhanh chóng và hấp thu không hoàn toàn qua đường tiêu hóa. 3. Chỉ định: Điều trị các triệu chứng do bệnh Parkinson vô căn, các tình trạng giống parkinson sau viêm não và các triệu chứng giống parkinson mà có thể sau chấn thương hệ thần kinh do các độc tố của carbon monoxide và Mn. Có thể dùng trên những bệnh nhân dùng chất bổ sung pyridoxine (vitamin B ₆). 4. Liều dùng: - Liều khởi đầu: 1 viên × 3-4 lần/ ngày. - Liều duy trì: 1- 1 ^{1/2} viên, mỗi ngày hoặc cách ngày. - Liều tối đa 8 viên/ ngày. 5. Chống chỉ định: - Quá mẫn với các thành phần của thuốc. - Bệnh nhân bị glaucoma góc hẹp. - Sang thương da nghi ngờ hoặc chưa chẩn đoán hoặc có tiền sử bệnh melanoma ác tính. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>6.Tác dụng phụ: <i>Thường gặp</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thần kinh trung ương: Lo âu, lú lẫn, trạng thái kích thích, trầm cảm, mất trí nhớ, mất ngủ, mệt mỏi, ảo giác, mất điều phối, rối loạn trương lực, loạn động. - Tim mạch: Hạ huyết áp thể đứng, hồi hộp, loạn nhịp tim. - Tiêu hóa: Buồn nôn, chảy máu đường tiêu hóa, nuốt khó. - Mắt: Mờ mắt... |
|--|--|---|

TLTK: Bộ Y tế (2018), *Dược thư quốc gia Việt Nam*, NXB Y học, Hà Nội; Thông tin hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất...

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Như Kính gửi - Lưu: ĐVTTT | <p>P.GIÁM ĐỐC P.CHỦ TỊCH HĐT&ĐT</p> <p style="text-align: center;"><i>(Đã ký)</i></p> <p>BS. Nguyễn Ích Tuấn</p> | <p>ĐV THÔNG TIN THUỐC</p> <p style="text-align: center;"><i>(Đã ký)</i></p> <p>DS. Viên Cẩm Tú</p> |
|--|--|--|