


Cà Mau, ngày 14 tháng 07 năm 2025

TỔNG KẾT BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 01/2025 - 05/2025

Kính gửi: Các khoa phòng lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Từ tháng 01/01/2025 – 30/05/2025, tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có 22 trường hợp xảy ra ADR đã được các khoa lâm sàng xử lý và báo cáo về khoa Dược. Số báo cáo ADR theo tháng được trình bày bằng biểu đồ 1.



Biểu đồ 1. Số báo cáo ADR từ tháng 01/2025 đến tháng 5/2025

Tổng hợp thông tin ADR

- Số lượng báo cáo ADR không đều giữa các tháng, trong đó số lượng báo cáo ADR nhiều nhất vào tháng 4 (7 ca) và tháng 5 (7 ca); ít nhất vào tháng 2 (2 ca).
- Các khoa lâm sàng có báo cáo ADR gồm: Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức (13 ca), hồi sức tích cực chống độc (2 ca), Nhi (2 ca), nội tim mạch (2 ca), ngoại tổng hợp (3 ca).

Tổng hợp thông tin người bệnh:

- Về giới tính: Nữ có 18 ca (85.7%) chiếm tỷ lệ cao hơn nam 4 ca (14.3%)
- Về tuổi: Các báo cáo ADR xuất hiện ở mọi nhóm tuổi, thấp nhất là 2 tuổi cao nhất là 81 tuổi, tuổi trung bình là 37.4 tuổi.
- Nguyên nhân dùng thuốc chính dẫn đến phản ứng có hại thường gặp nhất là sử

dùng giảm đau, sử dụng kháng sinh dự phòng trước khi mổ, các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, tiết niệu, tiêu hóa...ca, và trường hợp tự dùng thuốc ngoài bệnh viện

Thông tin phản ứng có hại của thuốc

- Thời gian trung bình phản ứng có hại xuất hiện (kể từ lần dùng cuối cùng của thuốc nghi ngờ): sớm nhất là 20 phút, có 1 trường hợp 2 ngày.
- Mức độ nghiêm trọng của phản ứng: phần lớn phản ứng có hại thường không nghiêm trọng, bệnh nhân chỉ ngứa, nổi mẩn đỏ 24 ca và có 4 ca nhập viện/Kéo dài thời gian nằm viện
- Kết quả sau khi xử trí phản ứng: có 24 ca hồi phục không có di chứng, 4 ca đang hồi phục.

Thông tin thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo tại bệnh viện

- Danh sách các thuốc nghi ngờ gây ADR tại bệnh viện được báo cáo trong giai đoạn tháng 01/2025 đến hết tháng 5/2025 được trình bày trong bảng 1:

TT	Hoạt chất	Số lượng
1	Diclofenac	10
2	Ceftriaxon	3
3	Amoxicillin/ clavulanic	2
4	Cefotaxim	2
5	Neofopam	1
6	Ciproloxacin	1
7	Atropin	1
8	Cefazolin	1
9	Meloxicam	1

- Đường dùng của thuốc: Truyền tĩnh mạch 8 ca; đặt trực tràng 6 ca, tiêm bắp 6 ca, uống 3 ca.

Khoa Dược bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tổng kết và thông báo đến các khoa lâm sàng. Khoa Dược xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các khoa lâm sàng đã tham gia báo cáo ADR và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp với mục tiêu bảo đảm sử dụng thuốc an toàn hợp lý nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bệnh nhân.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: Khoa Dược



P. CHỦ TỊCH HĐT&ĐT

P. GIÁM ĐỐC
BS. Trần Quốc Sử

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

DS. Viên Cẩm Tú